



# 大埔崇德黃建常紀念學校

## 《預防傳染病流程表》



# 大埔崇德黃建常紀念學校

## 《處理學生嚴重受傷流程表》



救護車電話：2735 3355

# 大埔崇德黃建常紀念學校

## 《處理學生嚴重受傷流程表》

通知以下任何一位急救老師 / 書記協助  
潘寶玉、周詠儀、姚榮昌、吳志光、曾燕梅  
潘淑婷、葉美玲、徐子楊、李小翠、曾 湜  
尹秀珍、陳順梅、伍栩婷、周明麗(書記 Fanny)  
【向負責急救的老師詳述學生的受傷情況】

通知校長、班主任、家長  
【向校長詳述學生受傷過程，  
並盡快通知班主任及家長有關  
學生的受傷情況】

負責急救的老師填寫  
詢問處之學生受傷紀錄冊

由校方召喚救護車  
【如有需要】

負責急救的老師需再填寫  
醫療室內資料較詳盡的學生  
受傷紀錄冊，以便交與  
救護員處理。

書記通知家長，  
並通知詢問處工友打開車閘等候救護車到校。

送院前，需通知原層樓工友取  
學生書包及學生手冊備用。

# 傳染病資料

# 《附件一》

| 疾病                    | 潛伏期<br>(天數) | 建議病假                                                                 |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 結膜炎<br>(紅眼症)          | 1-12        | 直至眼睛不再有異常分泌物                                                         |
| 小兒<br>麻痺症             | 7-14        | 首現病徵起計至少十四天                                                          |
| 桿菌痢疾                  | 1-7         | 直至肚瀉已經停止及大便化驗顯示沒有該病菌<br>(須取三個各相隔至少24小時的大便樣本作化驗)                      |
| 水痘                    | 14-21       | 約一星期或直至所有水疱變乾                                                        |
| 霍亂                    | 1-5         | 直至證實不再受感染(在完成抗生素療程48小時後,須取三個各相隔至少一天的大便樣本作化驗)                         |
| 白喉                    | 2-7         | 直至證實不再受感染(在完成抗生素療程至少24小時後,須有兩個各相隔至少24小時、以拭子從咽喉及鼻咽取得的樣本,而其培養物呈陰性化驗結果) |
| 手足口病                  | 3-7         | 直至所有水疱變乾或按醫生指示<br>如致病原確定為EV71型腸病毒,則直至所有水疱變乾後兩星期                      |
| 甲型肝炎                  | 15-50       | 由首現黃疸病徵起計一星期或按醫生指示為準                                                 |
| 麻疹                    | 7-18        | 出疹起計四天                                                               |
| 腦膜炎雙<br>球菌感染<br>(侵入性) | 2-10        | 直至完成清除病菌療程                                                           |
| 流行性<br>腮腺炎            | 12-25       | 由呈現腫脹起計九天                                                            |
| 德國麻疹                  | 14-23       | 出疹起計七天                                                               |
| 猩紅熱                   | 1-3         | 由服用抗生素當日起計五天或按醫生指示為準                                                 |
| 結核病                   | 不定          | 按醫生指示為準                                                              |
| 傷寒                    | 7-21        | 直至至少連續有三個各相隔至少24小時取得的大便樣本,化驗顯示沒有該病菌。(第一個大便樣本須於完成抗生素治療48小時後開始收集)      |
| 病毒性<br>腸胃炎            | 1-10        | 直至最後一次肚瀉或嘔吐後起計48小時之後                                                 |
| 百日咳                   | 7-10        | 直至已完成至少五天的抗生素療程或按醫生指示為準                                              |

以上建議只基於各種疾病的一般傳染期考慮。

其他因素如病童的臨床情況亦在考慮之列,主診醫生須以其專業判斷,就病假的長短作最後決定。